

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 24-6-66 508680

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE STRASBOURG

Tél. 34-14-63 - Poste 93

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MOSELLE, VOSGES)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux : Cité Administrative, 2, Rue de l'Hôpital Militaire

67 STRASBOURG

C. C. P. : STRASBOURG 55-08-86

ABONNEMENT ANNUEL

15 F.

20 Mai 1966

Supplément n° 2 du Bulletin du mois de Mai 1966

Avertissement

ARBRES FRUITIERS

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

Compte tenu de la poussée végétative, il importe de renouveler la protection à l'égard de ces maladies, de façon à neutraliser les contaminations primaires et secondaires qui pourront se produire à la faveur des prochaines précipitations.

Information

OIDIUM DU POMMIER

Dans les vergers infestés, profiter du traitement "Tavelure" pour renouveler la protection contre cette maladie.

Poursuivre l'enlèvement systématique des pousses oïdiées au fur et à mesure de leur apparition.

PUCERONS (différentes espèces)

On note actuellement sur de nombreuses essences fruitières des pullulations relativement importantes de Pucerons. Dans bien des cas, il est nécessaire de renouveler le traitement aphicide en employant de préférence un produit endotherapique (action systémique) permettant une protection prolongée.

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Les premières sorties en cage d'élevage sont notées depuis quelques jours et le temps chaud actuel va favoriser l'activité de ce ravageur. Attendre cependant un prochain avis pour intervenir.

VIGNE

OIDIUM DE LA VIGNE

Les premières manifestations de l'Oïdium pourront apparaître prochainement sur la jeune végétation des cépages les plus sensibles tels le Pinot et le Goldriesling.

Afin de prévenir le développement de ce champignon parasite, il est conseillé d'effectuer un premier traitement de préférence en poudrage. Le soufrage précoce présente en effet, certains avantages : il est facile à exécuter, il exige peu de Soufre et il est d'autant plus efficace qu'au début de son développement, l'Oïdium est très vulnérable. Précisons également que les produits soufrés ont une action sur les populations d'Acariens.

.../...

304

GRANDE CULTURE

- HOUBLON -

PUCERONS

On note actuellement les premières apparitions de Pucerons ailés sur feuillage et l'on peut prévoir l'installation prochaine des colonies.

Un traitement aphicide pourrait être réalisé avantageusement à partir du 23 Mai

Utiliser l'un des produits figurant sur la liste remise à chaque abonné (voir rubrique des Pucerons des arbres fruitiers).

L'emploi des spécialités à base de "Dimefox" (action aphicide et acaricide) qui s'utilisent en arrosage des pieds et dont l'action est prolongée, peut être envisagé avec profit.

En ce qui concerne le Thiodéméton présenté sous forme de granulés et dont l'emploi est également autorisé sur Houblon, on pourra l'utiliser à la dose de 10 gr. de spécialité commerciale à 5 % de M.A. par pied. Ces granulés seront ensuite enfouis par une légère façon culturale.

CULTURES MARAÎCHERES

(Note spéciale valable au cours de la période estivale)

I - AFFECTIONS DUES A DES INSECTES

VERS GRIS

Chenille grise ou verdâtre s'attaquant surtout au collet des plantes. Réaliser l'un des traitements suivants :

Par utilisation d'appât : L'appât est constitué par du son humecté avec une solution de :

- Dieldrine	:	4 gr.	de matière active	par kg de son.
- Aldrine	:	4 gr.	" "	" "
- Endosulfan	:	4 gr.	" "	" "
- D.D.T.	:	10 gr.	" "	" "

Pour 1 kg de son, ajouter le produit choisi dans 3/4 de litre d'eau. Arroser et bien pelleter le son pour assurer un mélange uniforme. Répartir l'appât au pied des plantes par petits tas, le soir de préférence.

En Pulvérisation : Utiliser le Trichlorfon en formulation liquide à la dose de 200 gr. de matière active par hectolitre d'eau.

PUCERONS

Par leurs piqûres, les Pucerons provoquent des déformations des feuilles qui se gaufront et se recroquevillent.

Dès l'apparition des premiers insectes, traiter avec : Nicotine, Roténone, ou un Ester phosphorique autorisé en culture maraîchère.

En cas de forte infestation, recourir au Mévinphos. Nous rappelons que le Mévinphos est le seul insecticide systémique autorisé en cultures maraîchères.

20 Mai 1966

V I G N E

CONCOURS POUR LA DETECTION DES PREMIERES TACHES DE MILDIOU

Le dépistage des premières taches de Mildiou de la vigne présente un intérêt certain. C'est la raison pour laquelle la Station d'Avertissements Agricoles organise cette année encore un concours de détection des foyers primaires de Mildiou.

Il sera procédé à la répartition des prix suivants :

- 3 prix d'une valeur de 25.- F. chacun.

- 8 prix d'une valeur de 15.- F. chacun.

L'envoi aura le maximum de chances d'arriver en parfait état si les feuilles sont enveloppées dans de la mousse ou du coton hydrophile légèrement humide et emballées dans un sachet en matière plastique.

Afin d'obtenir le maximum de précisions sur l'implantation de ces premiers foyers, nous vous proposons d'utiliser la fiche de renseignements ci-dessous.

(à détacher)

Nom et Prénoms :

Adresse :

Commune :

Lieu-dit :

Cépages :

Situation de la feuille malade sur
la souche (1ère, 2ème, 3ème, 4ème feuille, etc...) :

Nombre de taches observées dans la parcelle :

Situation de la parcelle : coteau - plaine :

Date de la découverte :

Signature :

305